

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione dei Disciplinari di Produzione Integrata 2024

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di OVADA.

Bollettino di difesa della vite n° 10 del 16/07/2024

Fase fenologica prevalente: **Chiusura Grappolo BBCH 77**

PERONOSPORA

Vista la pressione del patogeno e le continue bagnature mattutine, è necessario mantenere la copertura contro questa avversità. Utilizzare prodotti a base di **RAME METALLO (max 4 Kg di s.a./Ha).**

OIDIO

Abbinare al prodotto antiperonosporico **ZOLFO BAGNABILE** alla massima dose consentita in etichetta. Successivamente al trattamento liquido (min 48 ore dopo) è bene eseguire un trattamento con **ZOLFO IN POLVERE** a vegetazione asciutta, nelle ore più fresche della giornata.

MARCIUME NERO (BLACK ROTH)

Sono state segnalate alcune situazioni sintomatiche su foglie e grappoli. Si consiglia pertanto nei vigneti colpiti di eseguire un trattamento con prodotti a base di **AZOXYSTROBIN** o **TRIFLOXYSTROBIN** alla dose massima di etichetta, attivi anche per oidio.

SI RACCOMANDA DI EFFETTUARE IL TRATTAMENTO IN MANIERA ACCURATA TRATTANDO TUTTI I FILARI.

PER LE AZIENDE BIOLOGICHE VALE IL PRESENTE BOLLETTINO UTILIZZANDO SOLO PRODOTTI DI COPERTURA AMMESSI: ZOLFO BAGNABILE + RAME METALLO e SUCCESSIVO TRATTAMENTO CON ZOLFO IN POLVERE.

SI RACCOMANDA DI COMPILARE IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0143 /835083 – 0144/322272

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243

Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI